

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また必要なときに読めるよう、大切に保管して下さい。

ジーフェルスリムA

「ジーフェルスリムA」は、中国漢方「宣明論」に記載されている代表的な漢方処方「防風通聖散」に基づく製剤です。

⚠️ [使用上の注意]

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬により発疹、発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 腹痛、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------|---|
| 間質性肺炎 | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 |
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。 |

(2) 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合。

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
軟便、下痢

〔効能又は効果〕

腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：
高血圧の随伴症状（どうき、肩こり、のぼせ）、肥満症、むくみ、便秘。

〔用法及び用量〕

成人（15歳以上）1回4錠宛

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用する。

〔成分及び分量〕 1日量（12錠）中

| | | | |
|--------|------|-----------|--------|
| トウキ | 0.6g | マオウ | 0.6g |
| シャクヤク | 0.6g | ダイオウ | 0.75g |
| センキュウ | 0.6g | 乾燥硫酸ナトリウム | 0.375g |
| サンシシ | 0.6g | ビャクジュツ | 1.0g |
| レンギョウ | 0.6g | キキョウ | 1.0g |
| ハツカ | 0.6g | オウゴン | 1.0g |
| ショウキョウ | 0.2g | カンゾウ | 1.0g |
| ケイガイ | 0.6g | セッコウ | 1.0g |
| ポウフウ | 0.6g | カッセキ | 1.5g |

上記生薬より得た防風通聖散エキス粉末 2,750 mgを含む。添加物として、含水二酸化ケイ素、カルボキシメチルセルロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所にキャップをきちんと閉めて、外箱に入れて保管してください。
- (2) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) ビンの中の話物は、錠剤の破損を防ぐために入れてありますので、開栓後はすててください。
- (5) この文書は、本剤を使用の際に必要な注意事項などが記載されていますので、ビンと一緒に外箱に入れて保管してください。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔その他〕

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、錠剤の色が多少異なることや開栓後に、吸湿した場合は錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

本製品についてのお問い合わせは下記までお願い申し上げます。
中村薬品工業株式会社 お客さま係
〒635-0121 奈良県高市郡高取町大字丹生谷31.32
電話 0745-67-0038 FAX 0745-67-1438
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造元

中村薬品工業株式会社