

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

発毛促進薬

第3類医薬品

カロヤンアポジカ®G

特徴

- カロヤンアポジカGは、カルプロニウム塩化物水和物、カシュウチンキ、チクセツニンジンチンキ、パントテニールエチルエーテル、*l*-メントールを配合した発毛促進、ふけ、かゆみ等に効果がある医薬品です。
- ジェルローションタイプの液ダレしにくい製剤で、チューブ先端ノズルより頭皮に直接塗布できます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい

- (1) きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等のある頭皮
- (2) 頭皮以外



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(2) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流して、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------------------|
| 頭 皮 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| その他 | 全身性の発汗、それに伴う寒気、ふるえ、吐き気 |

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流して、医師又は薬剤師に相談して下さい

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-------------|
| 頭 皮 | 刺激痛、局所発汗、熱感 |

効能・効果

- 若はげ(壮年性脱毛症)、円形脱毛症、びまん性脱毛症、^{びまん性} 糠糠性脱毛症
- 発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防、薄毛
- ふけ、かゆみ
- 病後・産後の脱毛

若はげ(壮年性脱毛症) 円形脱毛症 脱毛(抜毛)の予防 ふけ、かゆみ 病後・産後の脱毛



用法・用量

1日2~3回、適量を頭髮地肌にすりこみ、軽くマッサージして下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
3. 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。
なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けて下さい。
4. 薬液のついた手で目等粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落として下さい。
5. 頭皮にのみ使用して下さい。

効果的にお使いいただくために

- (1) 頭皮を清潔な状態にします。(洗髪をおすすめします。)
 - (2) ノズル先端を頭皮にあてながらカロヤンアポジカGをつけます。
 - (3) マッサージして頭髪地肌によくすりこみます。
(洗髪後は、軽く乾燥し、頭皮のほてりを十分にさましてからお使い下さい。)
- マッサージは指先で頭皮を軽くもむようにして下さい。爪等できずつけないように、また、先の尖ったクシや金属ブラシは地肌をきずつけるおそれがあるので使用しないで下さい。
- 髪の長い方は、髪を分けて地肌によくすりこんで下さい。

イラストは、洗髪した場合の使い方です。



洗 髪



乾 燥



カロヤンアポジカG



マッサージ

成分・分量

100mL中

| 成 分 | 分 量 | はたらき |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| カルプロニウム塩化物水和物 | 1.09g (カルプロニウム塩化物として1g) | 血管を拡張するはたらきがあり、発毛促進効果があります。 |
| カシュウチンキ | 3mL (原生薬として1g) | 皮ふの脂質量を下げるはたらきがあり、抜毛の予防に効果があります。 |
| チクセツニンジンチンキ | 3mL (原生薬として1g) | 毛乳頭細胞を活性化するはたらきがあり、発毛促進効果があります。 |
| パントテニールエチルエーテル | 1g | パントテン酸の誘導体で、皮ふや頭髪の健康維持を助けます。 |
| l-メントール | 0.3g | 爽快感を与えます。 |

添加物：キサンタンガム、ポビドン、ヒドロキシエチルセルロース、1,3-ブチレングリコール、ポリソルベート80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、エタノール、pH調節剤、黄色5号

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
 2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 4. 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
 5. 染毛料等を使用している場合は、本剤の使用により、衣類や枕カバー等への色移りが起こることがあるので注意して下さい。
 6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
 7. 本品は、香料を配合しておりませんが、有効成分であるl-メントールや生薬のにおいがします。
- キャップを開ける際には、液ダレ防止のため、キャップを上にして開けて下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
 〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
 電 話 03 (6667) 3232
 受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

カロヤンについて詳しくは <http://www.karoyan.com/>

® 登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
 Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元
ニフ.ロパッチ株式会社
 埼玉県春日部市南栄町8番地1