

2007年2月改訂

- 服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要な時に読めるよう大切に保管してください
- 使用期限（パッケージ側面及びビシラベルに記載）を過ぎた製品は服用しないこと

耳なり 肩こりに ナリピタン

販売名：ナリピタン
(Medicine for Ringing in the Ear and Stiff Shoulders)

1. 気になる耳なり、肩こりを改善する内服薬です
2. 有効成分ニコチン酸アミド、パピペリン塩酸塩が、血行を改善し、ビタミンB群が加齢とともに衰えた神経の調子を整え、耳なり、肩こりを改善します

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1 次の方は服用しないこと
15才未満の小児
- 2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の耳鼻科用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(乗物酔い薬、かぜ薬、鎮咳去痰薬等)
- 3 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある)
- 4 長期連用しないこと



■相談すること

- 1 次の方は服用前に医師または薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 本人または家族がアレルギー体質の人 (4) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人 (5) 今までに他の抗ヒスタミン剤、乗物酔い薬、かぜ薬、鎮咳去痰薬等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人 (6) 緑内障(例えば、目の痛み、目のかすみ等)のある人、排尿困難な人
- 2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ等のアレルギー症状
泌尿器	排尿困難

- (2) 5～6日間服用しても
症状がよくなる場合

耳なり、肩こりに ナリピタン 医薬品

効能・効果

耳鳴症、皮膚炎、じんましん、にきび、吹出物、肩こり

用法・用量

次の量を毎食後に服用してください
(水またはお湯と一緒に服用してください)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2～3錠	3回
15才未満の小児	服用しないこと	

- <用法・用量に関連する注意>
・定められた用法・用量を厳守すること

成分・分量 (9錠中)

ニコチン酸アミド-180mg、カフェイン水和物-180mg、パピペリン塩酸塩-45mg、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB₁)-90mg、リボフラビン(ビタミンB₂)-9mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩-18mg、アロエ末-18mg、アミノ安息香酸エチル-270mg 添加物として、アラビアゴム末、カオリン、ケイ酸Mg、セラック、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、デキストリン、白糖、パレシヨデンブ、ヒマシ油、黄色4号(タートラジン)を含む

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かないところに保管すること
2. 直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
3. 本剤をぬれた手で扱わないこと
4. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
5. ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

— 製品のお問い合わせ先 —
お客様相談室 ☎ 06(6203)3625
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
原沢製薬工業株式会社
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-17

10076423

MADE IN JAPAN