

総合かぜ薬

ストナ[®] ジェルサイナスS

鼻水・鼻づまり、熱に効くかぜ薬

ストナジェルサイナスSは…

- かぜの鼻水・鼻づまりにすぐれた効果をあらわすベラドンナ総アルカロイドを配合した総合かぜ薬です。
- アセトアミノフェンが熱をさげ、痛みをやわらげます。
- のみやすいクリーム色のジェルカプセルで、中味は吸収されやすいように液状につくられています。
- 11才のお子様から服用できます。

⚠ 使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮痙去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
 - 高熱、排尿困難
 - 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)

- ぜんそく
- (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

便秘、口のかわり

(効 能)

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、発熱、頭痛、悪寒、せき、たん、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

(用法・用量)

下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	2カプセル	3回
11~14才	1カプセル	
11才未満	服用しないでください	

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) **カプセルの取り出し方**
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



(成分・分量と働き)6カプセル中

成 分	分 量	働 き
アセトアミノフェン	900mg	熱をさげ、痛みを緩和します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.3mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状を抑えます。
塩酸ジフェニルピラリン	4mg	せきの症状をやわらげます。
d,l-塩酸メチルエフェドリン	60mg	
リン酸ジヒドロコデイン	24mg	たんをうすめて出しやすくします。
塩酸ノスカピン	48mg	
グアイフェネシン	150mg	解熱・鎮痛成分の働きを高めます。
無水カフェイン	75mg	

添加物として、ラウリル硫酸Na、グリセリン脂肪酸エステル、ポリソルベート80、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ヒドロキシプロピルデンプン、ゼラチン、コハク化ゼラチン、グリセリン、D-ソルビトール、パラバン、酸化チタンを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5) カプセル剤は吸湿してやわらかくなる性質があるため、アルミ袋から出した後は、できるだけ乾燥した場所に保管してください。やわらかくなくても効果には変わりありません。



◎早くよくなっていただくためのアドバイス

1. **睡眠**をとり無理をしないことが治療の第一歩。特に熱がある時、せきが出る時には、できるかぎり仕事や家事を休み、床につきましょう。
2. **衣服**や寝具は体をあたたかく保てるものを。もちろん部屋もあたため、なるべく湯気をたてて空気の乾燥を防ぎましょう。
3. **汗**をかいたらタオルでふいて、下着をとりかえ、体を冷やさないようにしましょう。入浴は熱がさがっても1~2日はがまんしましょう。
4. **食事**はあたたかいもの、水分やビタミンの多いもの、カロリーの高いもの、消化のよいものを取りましょう。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(株) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkou/kyosei.html>
 電話 0120-459-931 (フリーダイヤル)

本製剤についてのお問い合わせは、お買い求めの
 お店又は下記にお電話・お申し込み下さい。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
 電話 03(5472)7893
 受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号