

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

水虫・たむしに1日1回

バリアクトHiクリーム

水虫治療剤

〔特徴〕

- 塩酸テルピナフィンの殺真菌作用と角質浸透性により、1日1回の塗布で白癬菌を殺菌します。
- ジフェンヒドラミン塩酸塩、グリチルレチン酸が水虫、たむし等による不快なかゆみ、痛みを鎮めます。
- イソプロピルメチルフェノールが患部周辺の雑菌の発生を抑えます。
- べたつかず、さらっとした使用感のクリーム剤です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤による過敏症（例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等）を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 乳幼児。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (7) 患部が化膿している人。
- (8) 妊婦又は妊娠している可能性のある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑（フケ、アカのような皮ふのはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合

〔効能・効果〕

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

〔用法・用量〕

1日1回、適量を患部に塗布してください。


(必ず裏面もお読みください)

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

〔チューブの穴のあけ方〕

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててあけてください。



〔成分〕 1g中

成分	分量	はたらき
塩酸テルピナフィン	10mg	白癬菌に選択的に作用し、菌の代謝を阻害し、発育増殖を阻止します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	5mg	患部のかゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	患部の炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	3mg	患部周辺の雑菌の発生を抑えます。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリソルベート60、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、アジピン酸ジイソプロピル、ステアリルアルコール、プロピレングリコール及び香料（d-カンフル）を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (5)本剤は油性物質を含んでいますので、塗布後すべりやすくなることがありますから注意してください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080（ダイヤルイン）

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

〔みずむし治療のアドバイス〕

<p>清潔</p>	<p>殺菌</p>	<p>冷やす</p>
<p>患部は常に清潔に。薬を塗る前に薬用石鹸で洗ったり、清浄綿でぬぐうと効果的。</p>	<p>みずむしの原因となる白癬菌を殺菌する抗白癬菌剤を用いた薬剤（バリアクトHクリームなど）を使います。患部へ塗布する場合は、広めに塗り、お風呂上がりの時が効果的。</p>	<p>ただれがひどい場合は、冷やすと同時に乾燥させるのに適切な軟膏を塗り、患部が乾燥してから液剤を用います。（温度25℃以上で繁殖）</p>
<p>乾燥</p>	<p>根気</p>	
<p>みずむしは乾燥が苦手。靴下、肌着は通気性のよい素材を選び、清潔に心がけます。（湿度75%以上で繁殖）</p>	<p>みずむしは再発と再感染しやすい病気です。自覚症状がなくなってもしばらくは治療を続けましょう。</p>	

発売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元

前田薬品工業株式会社

富山県富山市向新庄町1-18-47



E07

バリアクトHクリーム

バリアクトはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。